

Edad temprana de la primera relación sexual en hombres y mujeres de 18-34 años y factores asociados.

Fermina Chamorro, Erick Chu, Faride Rodriguez, Iris Sandoval

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud



OBJETIVOS

Estudiar asociaciones entre la edad temprana de la primera relación sexual y factores socio demográficos y conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres de 18 a 34 años con relaciones sexuales en el anterior a la encuesta en la República de Panamá en 2009.

MATERIALES Y MÉTODOS

Con datos de ENASSER 2009 se examinaron asociaciones bivariadas entre factores socio demográficos y tener una edad temprana a la primera relación sexual (ETPRS), antes de los 15 años, y luego su asociación a conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva en mujeres (2347) y hombres (1009) de 18-34 años, con relaciones sexuales en el último año. Se estudió este grupo para reducir el sesgo de memoria y la proximidad de la PRS. Se usó STATA/SE 13.1 con Chi cuadrado de Pearson y el Test de Wald con intervalo de confianza de 95%. No se incluyen datos de Guna Yala por falta de consentimiento del Congreso General.

RESULTADOS



Más mujeres estaban unidas (75%) y en pobreza extrema (50%), y más hombres conocían el condón (95%), avalaban la violencia a la mujer (26%), tuvieron más de una pareja sexual en el último año (32%) y una ETPRS (29%), con pareja no estable (45%). Más mujeres se oponían a la educación sexual a jóvenes (17%), no podrían conseguir un condón por sí mismas (25%) y no lo usaron en su PRS (77%). El conocimiento del VIH-SIDA fue bajo (17%) sin diferencia por sexo.

Las características socio demográficas no se relacionaron con la edad de la ETPRS, en hombres, sin embargo, más ($p < 0.5$) mujeres unidas (14%), con educación primaria o ninguna (29%), pobres extremas (14%), indígenas (31%), en áreas indígenas (33%) con otra o sin religión (26%) informaron una ETPRS.

En iniciadores tempranos más que tardíos ($p < 0.05$), es mayor el porcentaje de mujeres a favor de los roles tradicionales de género (76%), la violencia a la mujer (29%), sin conocimiento del condón (23%) y que no podrían conseguir uno por sí mismas (42%); de hombres que abusaron alguna vez de sustancias (75%) y que piensan que pueden tener más de una mujer a la vez (30%); y de mujeres y hombres con más de una pareja sexual en el último año (16% y 44%), que no uso condón en su PRS (84% y 93%) y sin conocimiento del VIH-SIDA (23% y 92%).

CONCLUSIONES

La desventaja social se relaciona con la ETPRS sólo en mujeres. La ETPRS se asocia a aceptación de la violencia a la mujer y los roles tradicionales de género, más de una pareja sexual en el último año, machismo, falta de conocimiento del VIH-SIDA y falta de acceso al condón.

Promover la educación en valores, derechos y deberes, la posposición del inicio de relaciones sexuales, el conocimiento de VIH-SIDA y el uso del condón debe contribuir a prevenir infecciones transmitidas sexualmente y embarazos no deseados.

REFERENCIAS

Makenzius M, Larsson M. Early onset of sexual intercourse is an indicator for hazardous lifestyle and problematic life situation. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*. 27(1): 20–26, 2013.

Diagnóstico sobre la situación de Violencia contra mujeres indígenas. Comarca Ngobe Bugle, Comunidad de Oma. Marzo-Junio 2012.

De León R, Martínez L, Chú E, Mendoza A, Chamorro F, Poveda C, Álvarez A, Flores H, Sandoval I, Rodríguez F. Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Panamá 2011.

