

PRUEBAS REALIZADAS POR LA SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA Y MALARIA, POR MES, SEGÚN TÉCNICA, AÑO 2020

| Técnica | Pruebas Realizadas | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| TOTAL | 3820 | 432 | 561 | 246 | 173 | 695 | 731 | 475 | 287 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Malaria - frotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Malaria - gota gruesa | 63 | 25 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Filaria - frotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Filaria - gota gruesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Chagas - frotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Chagas - gota gruesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Identificación de coccidios intestinales por tinción de Ziehl-Neelsen modificada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Babesia - diagnóstico o confirmación (frotis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Leptospira sp. por ELISA IgM | 299 | 37 | 41 | 34 | 12 | 35 | 25 | 25 | 31 | 59 | | | |
| Leptospira sp. por técnica de microaglutinación (MAT) | 342 | 2 | 120 | 20 | 0 | 40 | 40 | 60 | 0 | 60 | | | |
| Leptospira por cultivos | 170 | 8 | 116 | 14 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | | | |
| Leptospira en aguas. cultivo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| Leptospira sp.por campo oscuro | 554 | 0 | 5 | 14 | 144 | 206 | 49 | 82 | 48 | 6 | | |
| Leptospira sp.por PCR | 133 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 49 | 0 | 41 | 0 | | |
| Control de calidad indirecto (retesteo) | 2244 | 327 | 250 | 147 | 11 | 404 | 565 | 300 | 159 | 81 | | |

(1) Datos reportados hasta el mes actual