

PRUEBAS REALIZADAS POR LA SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA Y MALARIA, POR MES, SEGÚN TÉCNICA, AÑO 2025

| Técnica | Pruebas Realizadas | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre. | Octubre | Noviembre | Diciembre. |
| TOTAL | 11189 | 995 | 1438 | 638 | 2326 | 1393 | 824 | 1064 | 699 | 1102 | 710 | 0 | 0 |
| Malaria - frotis | 262 | 2 | 193 | 0 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
| Malaria - gota gruesa | 268 | 2 | 193 | 6 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
| Filaria - frotis | 43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| Filaria - gota gruesa | 43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| Chagas - frotis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| Chagas - gota gruesa | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| Identificación de coccidios intestinales por tinción de Ziehl-Neelsen modificada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Babesia - diagnóstico o confirmación (frotis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Leptospira sp. por ELISA IgM | 1083 | 158 | 92 | 85 | 197 | 150 | 85 | 79 | 60 | 110 | 67 | | |
| Leptospira sp. por técnica de microaglutinación (MAT) | 5641 | 420 | 589 | 448 | 1364 | 600 | 240 | 480 | 480 | 660 | 360 | | |
| Leptospira por cultivos | 2001 | 134 | 114 | 0 | 242 | 396 | 304 | 438 | 127 | 122 | 124 | | |
| Leptospira en aguas. cultivo | 416 | 60 | 114 | 9 | 93 | 56 | 39 | 18 | 0 | 9 | 18 | | |
| Leptospira sp.por campo oscuro | 220 | 8 | 24 | 16 | 76 | 18 | 16 | 6 | 12 | 18 | 26 | | |
| Leptospira sp.por PCR | 488 | 49 | 0 | 9 | 184 | 107 | 34 | 6 | 14 | 34 | 51 | | |
| Control de calidad indirecto (retesteo) | 717 | 162 | 41 | 64 | 56 | 60 | 104 | 33 | 0 | 135 | 62 | | |

(1) Datos reportados hasta el mes actual

Fuente: Sección de Parasitología y Malaria